

 پتیدین + لینزولید:

• سندروم سروتونین و سرکوب سیستم تنفسی

 وارفارین + تاموکسیفن:

• افزایش ریسک خونریزی

 فلووکسامین + تیزاندین:

• افت شدید فشار خون

 ترانزامیک اسید + ضدبارداری:

• افزایش ریسک ترومبوز

 سدیم والپروات + بوپروپیون:

• کاهش آستانه ی تشنج

 تریامترن اچ + اسپرونولاکتون:

• افزایش ریسک هایپرکالمی

 کلاریترومایسین + لوواستاتین:

• افزایش ریسک میوپاتی و رابدومیولیز

 اندانسترون + دومپریدون:

• طولانی شدن QT و آریتمی قلبی

 سیلدنافیل + نیتروگلیسرین:

• افت شدید فشار خون، سنکوپ و سکتته قلبی

 ریپاگلیناید + جم فیبروزیل:

• افت شدید فشار خون

 سوماتریپتان + ارگوتامین:

• افزایش شدید فشار خون

 سیم و استاتین + سیکلوسپورین:

• میوپاتی و نارسایی کلیه

 سیپروفلوکساسین + تیزاندین:

• برادی کاردی و افت شدید فشار خون

 آلپرازولام + کتوکونازول:

• سرکوب سیستم تنفسی و CNS

 ایبوپروفن + کتورولاک:

• افزایش ریسک HTN، خونریزی GI، نارسایی کلیه

 اس امپرازول + کلوپیدوگرل:

• افزایش ریسک سکتته قلبی و مغزی

 لینزولید + نور تریپتیلین:

• افزایش ریسک سندروم سروتونین و هایپر تنشن

 آسپیرین + ایبوپروفن:

• افزایش ریسک سکتته قلبی و مغزی

 کلشی سین + کلاریترومایسین:

• افزایش ریسک میوپاتی و رابدومیولیز

 تیوریدازین + ترامادول:

• آریتمی قلبی و سرکوب سیستم تنفسی

 توپیرامات + اتانول:

• سرکوب سیستم عصبی و تنفسی



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

بیمارستان برکت امام خمینی (ره)



موضوع:

تداخلات دارویی خطرناک

تهیه و تنظیم:

دکتر ثریا علیخانی



دکترای داروسازی

منبع:

Drugs.com

Uptodate

تاریخ تهیه:

21 تیر 1401

BAREKAT-NC/C -PAM

واحد امور دارویی



گریپ فروت + استاتین ها:

• میوپاتی، نارسایی کلیه و کبد



کلم و اسفناج + وارفارین:

• کاهش اثر وارفارین



لبنیات + سیپروفلوکساسین:

• کاهش جذب فلوروکینولون ها



گریپ فروت + سیکلوسپورین:

• افزایش ریسک عفونت و نفروتوکسیسیته



الکل + متفورمین:

• افت شدید قند خون همراه داروهای ضد دیابت



لبنیات + داکسی سیکلین:

• کاهش جذب تتراسیکلین ها



غذای ترش و تخمیری + MAO I ها:

• افزایش شدید فشار خون

<https://barakathosp.tbzmed.ac.ir>



هیدروکسی زین + پیموزاید:

• آریتمی قلبی



کلاریترومایسین + ارگوتامین سی:

• افزایش ریسک ایسکمی و سکته



متفورمین + مواد حاجب یددار:

• افت ریسک نارسایی حاد کلیه و لاکتیک اسیدوز



متوترکسات + آسیترسین:

• افزایش سمیت کبدی



فلوکستین + پیموزاید:

• طولانی شدن QT و آریتمی قلبی



فلوکونازول + ترامادول:

• افزایش ریسک آریتمی قلبی و تشنج و ...



دگزامتازون + دسموپرسین:

• هایپر تنشن و هایپوناترمی