

عوارض احتمالی :

✚ افزایش احتمال سرطان بیضه

✚ عقیمی یا کاهش میزان باروری

✚ عدم اصلاح مشکل (به علت شکل ظاهری) باعث

مشکلات روانی همراه با کاهش اعتماد به نفس در مرد می گردد.

✚ فقدان تکامل جنسی طبیعی

✚ افزایش خطر ضربه به بیضه

✚ خطر فتق همراه با عدم نزول بیضه

تشخیص :

در اکثر موارد با معاینه کلینیکی خوب، قابل تشخیص قطعی میباشد در صورتی که بیضه در مجرای نزول لمس نشود باید لاپاروسکوپی شود و وجود یا عدم وجود بیضه تشخیص داده شود.

درمان :

جراحی برای قرار دادن بیضه در کیسه بیضه میباشد

سن مناسب برای عمل از 6 تا 18 ماهگی است.

در بعضی موارد که علت بیماری کمبود هورمون هاست درمان با هورمون ممکن است مشکل بیماری را حل نموده و نیاز به جراحی نباشد.

علل عدم نزول بیضه :


علل هورمونی و مکانیکی

(کانالی که بین شکم و کیسه بیضه است بسته میباشد و یا بند

بیضه کوتاه است مانع عبور بیضه از شکم به جای اصلی اش

می شود) و یا کاهش فشار داخل شکم از دلایل عدم نزول

بیضه در کودکان است .



عدم نزول بیضه عبارت است از یک اختلال به علل مختلف که در هنگام

تولد یک یا دو بیضه از لگن به مکان طبیعی خود در کیسه بیضه نزول نکرده اند .

✚ 3 درصد از نوزادان پسر رسیده و 30 درصد از نوزادان پسر نارس

دچار عدم نزول بیضه هستند .


✚ چنانچه قرار باشد بیضه خودبخود نزول کند اکثرا 6-3 ماهگی در

محل طبیعی قرار خواهد گرفت .

✚ نزول بیضه خودبخودی بعد از یکسالگی غیر محتمل است .

علائم شایع عدم نزول بیضه :

کیسه بیضه در یک یا هر دو طرف تکامل نیافته به نظر میرسد . بیضه در مکان طبیعی خود در کیسه بیضه قابل لمس نیست . کیسه بیضه در سمت مبتلا رشد نکرده است بیضه در کیسه لمس نمیشود .



عدم نزول بیضه



بیماری بیضه نزول نکرده چیست؟

تهیه و تنظیم: سوپروایزر آموزش سلامت

تحصیلات: کارشناس پرستاری

منبع: پرستاری کودکان ویلی ونگ

تاریخ تهیه: دیماه 1400

BAREKAT-C -PAM

واحد آموزش سلامت

✓ کنترل درد با استفاده از مسکن های تجویز شده انجام شود

✓ برای جلوگیری از جابجایی بیضه از بازیهایی که نیاز به باز کردن

پاها دارد و فعالیت های شدید تا دو هفته بعد از عمل خودداری شود

✓ سه روز بعد از عمل به صورت ایستاده دوش بگیرد .

علائم هشدار :

در صورت بروز کیبودی یا ورم زیاد ، ترشح چرکی در ناحیه بیضه ها و یا

تب بالای 37/5 و خونریزی از بیضه و یا درد شکم به پزشک مراجعه

کنید .

نکته : 2-3 هفته بعد از عمل کمی ورم طبیعی است .

✚ بخیه ها در ناحیه کیسه بیضه قابل جذب است و نیازی به

کشیدن ندارد

✚ جهت کشیدن بخیه در ناحیه کشاله ران، 7 روز بعد از عمل

مراجعه کنید .

✚ شش ماه بعد از نظر آتروفی بیضه (تحلیل رفتن و کوچک شدن

(معاینه شود .

✚ تا سن یازده سالگی ، سالی یکبار از نظر بدخیمی بررسی شود .

✚ در صورت عدم تقارن بیضه ها به پزشک مراجعه شود

آمادگی قبل از عمل جراحی :

✓ افزایش آگاهی خانواده در خصوص اهمیت عمل جراحی:

بیضه ها به گرما حساس هستند و دمای داخل شکم هم نسبت به

دمای کیسه بیضه بالاست .باقی ماندن بیضه ها در داخل شکم باعث

خواهد شد که سلول های تشکیل دهنده اسپرم دچار آسیب

شوند.بنابراین با افزایش سن و عدم انجام جراحی ، احتمال ناباروری

افزایش می یابد .

✓ در کودکان زیر یک سال، تا 4 ساعت قبل از عمل شیر مادر و 6

ساعت پیش از آن شیر خشک می توان داد. در کودکان بالای 12

ماه، از ساعت 12 شب به بعد نمی توان غذای جامد و مایعات غیر

روشن نظیر شیر داد. در تمامی کودکان تا 2 ساعت قبل از

جراحی می توان آب روشن داد.

مراقبتهای بعد از عمل :

✓ جهت پیشگیری از عفونت ، محل عمل حتی الامکان به

ادرار و مدفوع آلوده نشود .

✓ چند ساعت پس از جراحی رژیم مایعات شروع می شود

رژیم غذایی به تدریج طی 24 ساعت به سمت رژیم کامل

می رود.