


در اغلب مواقع نیاز به بیهوشی عمومی نیست
از شب قبل ناشتا باشید .

ممکن است همان روز مرخص شوید و ای لازم
باشد 1 الی 2 روز در بیمارستان بمانید



قولنج کلیه



آسپرین و سایر داروهای ضدالتهاب را از چند
روز قبل باید قطع کنید

قولنج کلیه یک بیماری با درد
شدید پهلو بوده که به علت گیر
کردن سنگ ادراری در لوله حالب
و به دنبال آن انسداد و تورم کلیه
می باشد. در اکثر موارد سنگهای
کوچک حالب با تجویز مسکن
خودبخود دفع می شوند ولی در
مواردی که سنگ ها بزرگتر باشند
می توان از روش جراحی TUL
از راه مجرا بدون هیچگونه برش از
شکم و بی هیچ دردی سنگ را
خارج کرد



بیمارستان برکت امام خمینی

شکستن سنگ حالب

از طریق مجرای ادرار

(TUL)

تهیه تنظیم: رویا محمدی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

منبع: بروزر-سودارث 2018

تاریخ تهیه: 1400

تاریخ بازنگری: 1401

کد: BAREKAT-C -PAM

واحد آموزش سلامت

علایم هشدار:

در صورت تب و لرز و یا درد شدید پهلو و یا خونریزی واضح به پزشک اطلاع و مراجعه کنید.

❖ معمولاً دو هفته بعد طبق نظر پزشک

لازم است عکس ساده جهت کنترل

انجام شود

مراقبت در منزل:

چند روز آنتی بیوتیک خوراکی و مسکن مصرف خواهید کرد

مایعات زیادی مصرف کنید

جهت کمک به دفع خرده سنگها فعالیت کنید و حتما در یک ظرف ادرار نمایید تا در صورت دفع سنگ آنها از جهت آزمایش جمع آوری نمایید.

ممکن است چند روز ادرار خون آلود داشته باشید که با خوردن مایعات زیاد برطرف می شود