

می توانید با استفاده از دست ها و گرفتن دستگیره بالای سر، خود را روی تخت جایه جا کنید به این ترتیب عضلات یازو وش آنه تقویت می شود و بعدها راحت تر از وسایل کمکی برای حرکت استفاده می کنید.

جهت بهبودی استخوان های شکسته دخانیات را کنار بگذارید و مصرف الكل را قطع کنید.

مراقبت های قبل از عمل:

* شب یا صبح قبیل از عمل موهای ناحیه عمل را به فاصله ۲۰ سانتی متر از هر طرف بزندید.

* قبیل از عمل توسط پزشک پخش ویزیت می شوید در آن زمان سایقه بیماری های قلبی، ارثی و داروهای مصرفی را به پزشک اطلاع دهید.

* ناشتا بودن حداقل ۸ ساعت قبیل از عمل واجب است. تنها داروهایی که پزشک پخش به شما اجازه می دهد تا صبح روز عمل با مقدار کمی آب مصرف کنید.

* داروهایی مثل آسپرین، رقیق کننده های خون، داروهای ضدالتهاب باید از چند روز تا یک هفته قبیل از عمل مصرف نشود.

فیزیوتراپی

* در اوقات بیداری ورزش های مریوط به عضلات پا را طبق نظر پزشک و فیزیوتراپی انجام دهید تا جریان خون بهتر شود.

* هرچه زودتر تحت نظر پزشک و فیزیوتراپ حرکات مفاصل زانو را شروع کرده. می توان از وسایل کمک حرکتی مانند چوب زیر بغل و واکر استفاده کرد و محدودیت های توصیه شده برای فعالیت را رعایت کنید و به ناحیه عمل شده فشار وارد نکنید.

* تنفس عمیق و سرفه کردن به خروج ترشحات از ریه کمک می کند.

* دو الی سه هفته بعد از عمل جهت کشیدن بخیه حضور باید.

* از روز سوم به بعد می توانید حمام بروید. بخیه ها را تمیز و خشک نگه دارید. تعویض پانسمان باید بعد از مرخص شدن در منزل توسط پرستار یا همراه بیمار که در بیمارستان آموزش دیده انجام شود.

شکستگی تنہ استخوان ران:

استخوان ران از محکم ترین استخوان های بدن است و شکستگی آن نیاز به وارد شدن نیروی زیاد دارد. معمولاً این نیروها در حین تصادفات وسایل نقلیه و سقوط از ارتفاع می تواند به بدن وارد شود.

علائم شکستگی ران:

۱- ران متورم، دردناک، تغییر شکل یافته

۲- ناتوانی در حرکت دادن یا ایستادن

۳- خون ریزی زخم باز و بیرون زدن استخوان از پوست

۴- تجمع خون که باعث تغییر رنگ یا کبودی شدید ناحیه شکستگی می شود.

۵- گرفتگی عضله ران

۶- گز گز کردن ران یا پا
درمان:

در شکستگی های ران معمولاً اقدام اول جراحی می باشد و طی آن استخوان های شکسته به هم وصل می شود که بهترین زمان آن ۴۸ ساعت اول بعد از آسیب است تا عوارض کاهش یابد. درمان غیر از جراحی شکستگی استخوان ران به صورت کشش و سپس گج گیری است که گاهی اوقات یک پین پایین تر از ناحیه شکسته شده قرار می دهند و حدود یک یا دو ماه پایی بیمار به وزنه متصل می شود که با این کار استخوان جا به جا شده به جای اول خود بازمی گردد.

بیمارستان برکت امام خمینی(ره) میانه



شکستگی تنہ استخوان ران

تھیه و تنظیم: پروانه نوروزی

کارشناس پرستاری

منبع: بروونر سودارت ۲۰۱۸

سال تھیه ۱۳۹۷

سال بازنگری ۱۳۹۹

Barekat-Nc/c-Pam

واحد آموزش سلامت

مراقبت بعد از عمل:

تسکین درد:

در مدت کوتاهی پس از جراحی به سرعت کاهش می یابد. بعد از ۲ الی ۳ روز اغلب فقط گاهی برای رفع سفتی و گرفتگی عضلات به داروهای مسکن طبق دستور پزشک نیاز بپدا می کنید.

* برای کنترل درد با بلند کردن اندام عمل شده و استفاده از کیسه یخ می توان به کنترل درد و تورم کمک کنید.

* با تغییر وضعیت و آرامش فکری و پرت کردن حواس به کاهش درد کمک کنید.

* در صورت تورم و درد غیرقابل کنترل، سردی و رنگ پریدگی انگشتان و فلنج، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

خوردن و آشامیدن:

تا چند ساعت نباید چیزی خورده شود. بعد از چند ساعت، می توان پس از کسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب به بیمار داد و اگر تحمل کرد و دچار ناراحتی نشد می توان به تدریج به او مایعات بیشتری داد. بعد از اینکه رژیم غذایی برای بیمار شروع شد در صورت مبتلا نبودن به بیماری های خاص (قلبی، تنفسی، دیابت و ...) از کلیه مواد غذایی می توان بهره برد.

برای بهبود باید بافت جدید ساخته شود که این نیاز به انرژی فراوان دارد و غذا باید سرشار از گلوکز، چربی، پروتئین، املاح و ویتامین ها باشد. یبوست از عوارض بعد از عمل می باشد که به دلیل کاهش حرکت و استفاده از مسکن ها رخ می دهد. آب کافی - مصرف مواد غذایی حاوی فیبر از جمله سبزیجات - غلات - میوه، حرکت سریع تر و نرم کننده های مدفوع می تواند برای پیشگیری از یبوست مصرف شود.

خطر عفونت بعد از جراحی:

* ممکن است پزشک معالج داروهای آنتی بیوتیک خوراکی برای شما تجویز کند تا بعد از مرخص شدن از بیمارستان تا مدتی از آنها در منزل استفاده کنید. از قطع کردن آن بدون دستور پزشک خودداری کنید.

* در صورت داشتن علائم عفونت از جمله تب، لرز، قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید.

* بعد از جراحی ممکن است داروهایی داده شود تا از لخته شدن خون در پاهای جلوگیری شود. به این داروها داروهای رقیق کننده خون می گویند. استفاده از این داروها ممکن است تا چند هفته بعد از جراحی هم ادامه پیدا کند.